English	HYBRID CHILLI (SINCO ALFA 40)	ಕನ್ನಡ	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (1)	ಮರಾಠಿ	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (2)	ಗುಜರಾತಿ	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (3)	ಪಂಜಾಬಿ	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (4)	ತಮಿಳು	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (5)	ಮಲೆಯಾಳಂ	ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (6)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over	ಹೊಲ ಶುಚಿ	ಹೂಳಿ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷ, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಶ೿ತಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ	ಮಾಗಿಲ್ ಪಯಿರ್ಗಳ್ ಅವಶೇಷಂಗಳ್, ಕಳೈಗಳ್, ಪழೈಯ ಕೊಡಿಗಳ್ ಮற்றும் நோய்த்தாக்கம்/சேதம் அடைந்த தாவர பகுதிகளை விதைப்பதற்கு முன்னர் அகற்றவும். பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களின் எஞ்சிய தாக்கத்தை குறைக்க வயலின் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.	ખેત સ્વચ્છતા	ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.5-7.0. Avoid waterlogging, as CHILI is sensitive to excess moisture	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ	ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.5-7.0. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	मातीची गुणवत्ता	ચોક્કસ ગુણધર્મ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, and micronutrients. Apply fertilizers based on test results.	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ EC, pH ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಿ.	मातीची परीक्षण	ઉપલબ્ધ નથી	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
Climate Suitability	Climate Requirement Temperature range: optimum temperature: 25-30 °C Avoid waterlogging Annual rainfall: 625-1500 mm is ideal if well-distributed.	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಇಷ್ಟವಾದ ತಾಪಮಾನ: 25-30 °C ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ: 625-1500 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೆ ಸೂಕ್ತ.	ચોમાસાની આવશ્યકતા	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ
Land preparation	Land Preparation 2-3 deep ploughings followed by harrowing to make fine tilth. Form beds (0.45 m) or ridges (narrower spacing) before transplanting. Raised beds are adopted recommended in heavy soil areas for proper drainage.	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ 2-3 ಆಳ ಉಳುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ (0.45 ಮೀ) ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳನ್ನು (ಕಿರಿದಾದ ಅಂತರ) ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ. ಭಾರೀ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.	मशागत	ખેતર તૈયાર કરવું	ಹೊಲ ತಯಾರಿ
Sowing Time	Sowing Time / Season • North India: Nursery sowing in January-February (for summer crop) and June-July (for Kharif) • Peninsular India: Throughout the year, depending on irrigation Transplanting after 30-40 days when seedlings are 12-15 cm tall (Source: Kerala Agriculture Dept & Vikaspedia)	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ • ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನರ್ಸರಿ (ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಖರೀಫ್) • ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ: ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 30-40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಸಿ ಮಾಡಿ, ಸಸಿಗಳು 12-15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಗ (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಪೆಡಿಯಾ)	ઉનાળાની વાવણી	ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ	ಖರೀಫ್ ಬೆಳೆ	ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ	ಖರೀಫ್ ಬೆಳೆ	ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: 400 g/acre (open-pollinated) or 100 g/acre (hybrid) Sowing: Nursery sowing; transplant when 12-15 cm tall (height), cover with shade net; irrigate lightly until germination Spacing: 45 × 30 cm for irrigated crop; 75 × 60 cm on rainfed condition (Source: Kerala Agriculture Dept)	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ ಬೀಜ ದರ: 400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ) ಅಥವಾ 100 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) ಬಿತ್ತನೆ: ಸಸಿಗಳ ನರ್ಸರಿ; ಸಸಿಗಳು 12-15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿ; ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿ ಅಂತರ: ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 45 × 30 ಸೆಂ.ಮೀ; ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ 75 × 60 ಸೆಂ.ಮೀ (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ)	ખાતર	ಗೊಬ್ಬರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ
Seed Treatment	Seed Treatment Treat seeds with Trichoderma viride @ 4 g/kg seed or Pseudomonas fluorescens @ 10 g/kg before sowing to prevent fungal diseases. For chemical treatment: Captan or Thiram @ 2 g/kg seed.	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ (4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ) ಅಥವಾ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ (10 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಮ್ (2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ).	ચોમાસાનું વાવેતર	ಮಳೆಗಾಲದ ಬೆಳೆ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
Weed Management	Weed Control First hand weeding at 20-30 days after transplanting and second at 40-45 days Mulching with plastic or organic residues helps control weeds and conserve soil moisture Avoid deep hoeing near roots	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದಲ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ 20-30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು 40-45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಶೇಷಗಳಿಂದ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಬಳಿ ಆಳವಾದ ಹೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.	ખેત વ્યવસ્થાપન	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management Apply based on soil test. General guideline per hectare: • N: 150-200 kg/ha (N.P.O.S.-K.O) Application schedule: - Full P & K and half N as basal dose before transplanting. - Remaining N in two equal splits — at 30 and 60 days after transplanting Use Azospirillum and Phosphobacteria @ 2 kg/ha along with organic manure. (Source: Kerala Agriculture & Vikaspedia)	ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್: • ಸಾರಜನಕ: 150-200 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (N.P.O.S.-K.O) ಅನ್ವಯಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: - ಪೂರ್ಣ P ಮತ್ತು K ಮತ್ತು ಅರ್ಧ N ಅನ್ನು ಮೂಲ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸಿ. - ಉಳಿದ N ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ — ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ಮತ್ತು 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ವಯಿಸಿ. (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಪೆಡಿಯಾ)	ખાતર વ્યવસ્થાપન	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ
Irrigation Management	Irrigation Management Maintain uniform soil moisture; avoid water stress and waterlogging • Frequent irrigation after transplanting; light irrigation • Transition to flowering stage: irrigation every 5-7 days in light soils and 7-10 days in heavy soils. • Avoid excess irrigation during flowering and fruit maturity to prevent fruit rot Drip irrigation improves yield and water efficiency. (Source: KAU(M Kerala)& & Kerala Agriculture)	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ • ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ; ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ • ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಹಗುರ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5-7 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳು. • ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪಕ್ವತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. (ಮೂಲ: KAU(M Kerala)& & Kerala Agriculture)	સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
Pest Management	Pest Management 1. Fruit borer (Helicoverpa armigera): Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 4 g/10 L water or Spinosad 45% SC @ 0.5 ml/L 2. Thrips & Mites: Use Blue Sticky Traps (5 Kanes, spray Fipronil 5% SC @ 1 ml/L or Imidacloprid 17.8% SL @ 0.5 ml/L 3. Leaf curl virus: Control whitefly vector with Imidacloprid 17.8% SL @ 0.5 ml/L, Acetamiprid 20% SP @ 1 g/10 L water or Thiamethoxam 25% WG @ 1 g/10 L water or Thiamethoxam 25% WG @ 1 g/10 L water. (Source: Agri-Khet & ICAR)	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ 1. ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವವರು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ): ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% ಎಸ್‌ಜಿ @ 4 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್‌ಸಿ @ 0.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ 2. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಳಗಳು: ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಳಸಿರಿ (5 ಕೆನೆಸ್, ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್‌ಎಲ್ @ 0.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ 3. ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ವೈರಸ್: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್‌ಎಲ್ @ 0.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್, ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ @ 1 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 1 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 1 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು. (ಮೂಲ: ಅಗ್ರಿ-ಖೆತ್ & ICAR)	પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
Disease Management	Disease Management 1. Anthracnose / Fruit rot: Seed dressing with Copper Oxychloride 0.25% or Mancozeb 0.25% 2. Powdery mildew: Spray Hexaconazole 1 ml/L or Sulphur dust 20 kg/ha 3. Wilt complex: Drench Copper oxychloride 0.75% or Metalaxyl + Mancozeb 0.25% at 30 day interval. 4. Leaf curl / Mosaic virus: Control whitefly (vector) using Imidacloprid 3.5 ml/L; remove infected plants. (Source: Agri-Khet & Kerala Agriculture)	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ 1. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ / ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ: ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 0.25% ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 0.25% 2. ಪುಡಿ ಹಿಟ್ಟು: ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಧೂಳು 20 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ 3. ವಿಲ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ: ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 0.75% ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 0.25% ಅನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಎಲೆ ಸುರುಳಿ / ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್: ಬಿಳಿನೊಣ (ವೆಕ್ಟರ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 3.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್; ಸೋಂಕಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. (ಮೂಲ: ಅಗ್ರಿ-ಖೆತ್ & ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ)	રોગ વ્યવસ્થાપન	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield First picking at 75-90 days after transplanting. Continue picking at 7-10 day intervals Yield: Green chilli : 80-100 q/ha; Dry chilli : 20-25 q/ha depending on variety and management	ಕೊಯ್ಲು / ಇಳುವರಿ	ಕೊಯ್ಲು / ಇಳುವರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 75-90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು. 7-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಳುವರಿ: ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ : 80-100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್; ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ : 20-25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ.	કાપણી અને ઉપજ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling Harvest mature, unripe fruits; avoid mechanical damage Dry chillies under shade or polyhouse till moisture content is 8-10% Pack in cool, dry, well-ventilated area using gunny bags or polyfilm-lined bags.	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ವ ಹಣ್ಣುಗಳು; ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ 8-10% ಆಗುವವರೆಗೆ ಒಣ, ಶೀತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಫಿಲ್ಮ್-ಲೇಪಿತ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ.	અનુગામી સંચાલન અને સંગ્રહ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ
Disclaimer	These recommendations are based on KAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕರಣ	ಅಸ್ವೀಕರಣ	ಅಸ್ವೀಕರಣ	ಅಸ್ವೀಕರಣ	ಅಸ್ವೀಕರಣ	ಅಸ್ವೀಕರಣ