PRACTICES	HYBRID WATERMELON (SISCO BLACK SHOT)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯ	ಬಹುವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	অসমীয়া	ಬಹುವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಅಸ್ಸಾಮಿ	ಬಹುವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್	ಕಲಿಯಿಲಿನ ಸಿಹಿಗಳಿಗೆ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯ	ಬಹುವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್	ಕಲಿಯಿಲಿನ ಸಿಹಿಗಳಿಗೆ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯ	ಬಹುವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)	ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್	ಕಲಿಯಿಲಿನ ಸಿಹಿಗಳಿಗೆ (ಸಿಸ್ಕೊ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಟ್)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	খেতি পথাৰ	বুৰুগী বা পুৰণি বিয়লী অৱশেষ বা ঝাউৰি, জাংঘাসত, পুৰণি তৰি এৰি গৰিয়ৎসমূহিতকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। খেতি এৰি যোৱা বা ৰোগ বা কীট দ্বাৰা ক্ষতি হোৱা উদ্ভিদ বাদ দিয়া হয়।	বিয়নৰি সংগ্ৰহ	ৰোগ বা কীটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বুৰুগী বা পুৰণি বিয়লী অৱশেষ, ঝাউৰি, জাংঘাস আৰু পুৰণি তৰি বাদ দিয়া হয়। বিয়নৰ আগতে খেতি পথাৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়।	ಕೊಳ ಸಾಫಾಯಿ	ಕೊಳ ಸಾಫಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.	ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ	ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ	ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
Soil requirement	Sandy loam to loam soils, well-drained, fertile; rich in organic matter. Ideal pH 6.0–7.0. Avoid waterlogging as watermelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	মাটি আৱশ্যক	বালুকা দোমট বা দোমট মাটি, ভালদৰে নিকাশী কৰা, উৰ্বৰ আৰু জৈৱিক পদাৰ্থেৰে ভৰপূৰ। আদৰ্শ pH হ'ল 6.0–7.0। জলাবদ্ধতা এৰি থকা উচিত কাৰণ তৰমুজৰ গছৰ মূল অগভীৰ আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হোৱা হয়।	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ	ಸಡಿಲ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಣ್ಣು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ; ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಆದರ್ಶ pH 6.0–7.0. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	মাটি পৰীক্ষণ	মাটিৰ ৰাসায়ণিক গঠন, কাৰ্বনিক পদাৰ্থ (OC) আৰু সূক্ষ্ম-স্থূল পুষ্টিকণ্ড (ৰসায়ণ) ৰ বিষয়ে অন্ততঃ 2-3 বছৰ এবাৰ অন্ততঃ মাটি পৰীক্ষণ কৰা উচিত আৰু পৰীক্ষণৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা।	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	EC, pH, OC ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಮಾಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
Climate Suitability	Watermelon is a warm-season crop. Optimum temperature: 25–35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	আবহাওয়া অনুকূলতা	তৰমুজ গৰম কালিৰ বাবে উপযুক্ত শস্য। প্ৰকৃতি বিৰ্ত্তাৰ অনুকূলতাৰ তাপমাত্ৰা 25-35 ডিগ্ৰী সেলিয়াছ হ'ল। কাষ্ঠ আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতা কালি এৰি থাকা উচিত। শুষ্ক আৰু গৰম কালি তৰমুজৰ মিঠা বঢ়ায়।	ಅಕ್ಷಿಕ ಲೇಖಾಂಶ	ತರಬೂಜಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ 25–35 °C. ಹಿಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಣ, ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.	ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು	ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು
Land preparation	Deep ploughing 2–3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 9–10 tons FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	ভূমি সাজ কৰা	গভীৰ লাঙল দিয়া (2-3 বাৰ) আৰু মাটি মিহি কৰিবলৈ বিন্ধা দিয়া হয়। প্ৰতি একৰত 9-10 টন গোবৰ বা কম্পোষ্ট মিলোৱা। জলৰ ভাল নিকাশীৰ বাবে বিশেষকৈ ভাৰী মাটিত, ৰিজ বা উঠোৱা বেডৰ সৃষ্টি কৰিবা।	ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ	2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಣಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹರೋವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕರೆಗೆ 9-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.	ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ	ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb. Off-season: Sept-Oct	বুৱাই সময়	বসন্ত-গ্ৰীষ্মকালীন শস্য: নভেম্বৰ-ফেব্ৰুৱাৰী, অফ-মৌসুম: সেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ವಸಂತ-ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್	ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ	ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350–400 grams/acre (open-field). Sowing: In ridges or raised beds, 1.5–2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5-0.75 m	বীজ হাৰ আৰু দূৰত্ব	বীজ হাৰ: 350-400 গ্ৰাম/একৰ (মুকলি খেতি)। বপন: ৰিজ বা উঠোৱা বেডত, 1.5-2 সেমি গভীৰত। ভাল অঙ্কুৰোদ্গমৰ বাবে মাটিত আগতে জল দিয়া। দূৰত্ব: 2 মি × 0.5-0.75 মি	ಬೀಜ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜದ ದರ: 350-400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಮುಕ್ತ ಹೊಲ). ಬಿತ್ತನೆ: ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿರಿ. ಅಂತರ: 2 ಮೀ × 0.5-0.75 ಮೀ.
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	বীজ চিকাৰ	বুৱাই বীজ বোৱাৰ আগে কাৰ্বেণ্ডাজিম বীজ প্ৰতি কে জি ২ গ্ৰাম হিচাপে বীজ চিকাৰ কৰা আৰু তাৰপিছত ট্ৰাইকোডাৰ্মা বিৰিডে কে জি ৪ গ্ৰামহিচাপে বীজ চিকাৰ কৰা হয়।	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–6 weeks. Use shallow hoeing, mulch/leaf operations, or mulching. Tier to three weedings may be required.	আগাছা দমন	পুৰণি 2-4 প্ৰকাৰৰ তৰমুজ জাতৰ আগাছা মুকলি কৰি। প্ৰথমে বিন্ধাই, প্ৰয়োজন অনুসাৰে মাটিৰ পাত ৰাখিবা বা আগাছা কাঢ়ি। এই কাৰ্য্য তিনি বিন্ধাই কৰা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে।	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಮೊದಲ 3-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ರಹಿತ ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕುಂಟೆ, ಮಲ್ಚ/ಎಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea ~110 kg, SSP ~155 kg, MOP ~40 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing; remaining N along vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2-3 g/L at 30-35 DAS; 0:0:50 + Micronutrients @ 25 and 50 d. at 50 DAS.	উৰ্বৰক প্ৰয়োগ	সাৰ বা কম্পোষ্ট: 8-10 টন বোৱাৰ আগে। ৰাসায়ণিক উৰ্বৰক: ইউৰিয়া ~110 কি.গ্ৰা., এছএছপি ~155 কি.গ্ৰা., মিউৰিয়েট অফ পটাশ ~40 কি.গ্ৰা.। বোৱাৰ সময়ে সম্পূৰ্ণ ফছফৰস আৰু পটাশ আৰু নাইট্ৰোজেনৰ 1/3 প্ৰয়োগ কৰা হয়, বাকী নাইট্ৰোজেন লতাৰ বৃদ্ধি আৰু ফলৰ সংযোজনৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰা হয়। ফলিয়াৰ স্প্ৰে: 19:19:19 + ক্ষুদ্ৰপোষকাংশ @ 2-3 গ্ৰাম/লিটাৰ, 30-35 দিনৰ পাচত 0:0:50 + ক্ষুদ্ৰপোষকাংশ @ 25 আৰু 50 দিনৰ পাচত।	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಎಫ್‌ಯಿಎಂ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ 8-10 ಟನ್. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಯೂರಿಯಾ ~110 ಕಿಲೋ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ~155 ಕಿಲೋ, ಎಂಒಪಿ ~40 ಕಿಲೋ. ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಫಾಸ್ಫರಸ್ & ಪೊಟಾಷ್ + 1/3 ಸಾರಜನಕ ಹಿಡಿದು, ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: 19:19:19 + ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು @ 2-3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ 30-35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ; 0:0:50 + ಸೂಕ್ಷ್ಮಪೋಷಕಾಂಶಗಳು @ 25 ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳು 50 DAS ನಲ್ಲಿ.
Irrigation Management	Uniform irrigation, avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3–6 days before harvest to improve sweetness.	সিঞ্চাই ব্যৱস্থা	সমান সিঞ্চাই কৰা, পানীৰ অভাৱ আৰু জলাবদ্ধতা এৰি থাকা। গৰমত: বালুকা মাটিত প্ৰতি সপ্তাহে এবাৰ বা তাতকৈ অধিক বাৰ। চিনিয়ৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কাটিবলৈ 3-6 দিন আগতে সিঞ্চাই বন্ধ কৰা বা হ্ৰাস কৰা হয়।	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಮಾನ ನೀರಾವರಿ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ: ಮರಳು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ. ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 3-6 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ/ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	ಸಿಂಚನ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಿಂಚನ ನಿರ್ವಹಣೆ
Pest Management	Aphids & Thrips: Thamethoxam @ 5 gm/10 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/10 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Neem-based (oil/cake) 10 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 3-4 times at 10 day intervals.	কীট নাশক	পাতিয়া আৰু থ্ৰিপছ: থামেথক্সাম 5 গ্ৰাম/10 লিটাৰ পানী। পাত খনন: এবামেক্টিন 6 মিলি/10 লিটাৰ। ফল মাখি: সংক্ৰমিত ফলবোৰ কাঢ়ি পেলোৱা। নিমৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা (তেল/খলি) 10 গ্ৰাম/লিটাৰ পানী + ম্যালাথিয়ন আৰু গুড়ৰ দ্ৰৱণ 10 দিনৰ ব্যৱধানত 3-4 বাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়।	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗಿಡಹೇನು ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್: ಥಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ @ 5 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀ ನೀರು. ಎಲೆ ಸುರಂಗ: ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ @ 6 ಮಿಲಿ/10 ಲೀ. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ: ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬೇವು ಆಧಾರಿತ (ಎಣ್ಣೆ/ಕೇಕ್) 10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು + ಮಲಾಥಿಯಾನ್ + ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣ 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 gm/10 L, 2–3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Mancozeb 60% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM, spray systems + conidial fungicide when needed.	রোগ নাশক	পাতৰী উইলড: জল গুলুৱাবলৈ গন্ধক 20 গ্ৰাম/10 লীটাৰ, 10 দিনৰ ব্যৱধানত 2-3 বাৰ। ডাউনী মিলডিউ: মেনকোজেব 60% ডব্লিউপি @ 2 গ্ৰাম/লীটাৰ। হঠাৎ উইলট: জলাবদ্ধতা এৰি থাকা। ট্ৰাইকোডাৰ্মা বিৰিডে 1 কিলো + 50 কিলো ফাৰ্ম য়ামাৰ (FYM), প্ৰয়োজনীয় সময়ত + ছাঁটা ফুঙনাশকৰ ছিটকন দাও।	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಲ್ಫರ್ 20 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀ, 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಪ್ರೇಗಳು. ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ 60% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ. ಅಕಾಲಿಕ ಒಣಗುವಿಕೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ 1 ಕೆಜಿ + 50 ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ (FYM), ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು + ಕೊನಿಡಿಯಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Watermelon gives average 25-28 ton fruits per acre.	কাঢ়া আৰু ফলন	আধা-স্লিপ স্তৰ (স্থানীয় বজাৰ) বা পৰিপক্ক-সবুজ স্তৰ (দীঘল পৰিবহণ). তৰমুজ প্ৰতি একৰত গড়ে 25-28 টন ফল দিয়ে।	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಅರ್ಧ-ಸ್ಲಿಪ್ ಹಂತ (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವತೆ-ಹಸಿರು ಹಂತ (ದೀರ್ಘ ಸಾಗಣೆ). ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 25-28 ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	কাঢ়াৰ পাছত ব্যৱস্থাপনা আৰু সঞ্চয়ন	কাঢ়াৰ পাছত ফলবোৰ শীতল ঠাইত ৰাখা। আকাৰ আৰু গুণমানৰ অনুসাৰে শ্ৰেণী-বিভাগ কৰা। প্ৰস্তাৱিত তাপমান অনুসাৰে ফলবোৰ সঞ্চয় আৰু পৰিবহণ কৰা।	ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಹಣ್ಣುಗಳನ್ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೇಣಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಾಪಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಿ.
Disclaimer	These recommendations are based on SASU, government agencies, and trial content. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	অস্বীকৰণ	এই পৰামৰ্শবোৰ SASU, সৰকাৰী সংস্থাসমূহ আৰু পৰীক্ষাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। প্ৰকৃত ফলাফল মাটিৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ু, বিভিন্ন জাত আৰু শস্য ব্যৱস্থাপনা অনুসৰিয়া বিভিন্ন হব পাৰে।	ಅಸ್ವೀಕರಿಸಿ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಸು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.