PRACTICES	HYBRID MUSKMELON (SISCO HONEY)	ఆచరణలు	ప్రతిపాదిత ఆచరణలు (హైబ్రిడ్ ద్రాక్ష)	ఆచరణలు	ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు (తెల్ల ద్రాక్ష-2)	పద్ధతులు	ప్రతిపాదిత ఆచరణలు (హైబ్రిడ్ ద్రాక్ష)	ప్రధాన ప్రత్యామ్నాయాలు	ఎంపరర్‌కు ప్రాధాన్యమైనది : సిఫార్సు చేయబడిన వ్యూహం (Recommended Strategy)	ఆచరణలు	ప్రత్యేక అవసరాలు / ఖర్చు (₹/ha)	అవసరమైన ఇన్‌పుట్‌లు	ప్రత్యేక ఉపయోగాలు / ఖర్చు (₹/ha)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	దుక్కి తర్వాత	పూర్తి తీగ అవశేషాలు / కలుపు మొక్కలు, పాతవి, దెబ్బతిన్న మొక్కల భాగాలను విత్తడానికి ముందే తొలగించాలి. పొలం గట్ల వెంట శుభ్రంగా ఉంచాలి.	పొలంలో	ఇటీవలి పంటల అవశేషాలు, కలుపు మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన/దెబ్బతిన్న మొక్క భాగాలను విత్తడానికి ముందు తొలగించాలి. పొలం గట్ల వెంట శుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల తెగుళ్లు, వ్యాధుల వ్యాప్తి తగ్గుతుంది.	పద్ధతి	ఇటీవలి పంటల అవశేషాలు, కలుపు మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్క భాగాలను విత్తడానికి ముందు తొలగించాలి. పొలం గట్ల వెంట శుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల తెగుళ్లు, వ్యాధుల వ్యాప్తి తగ్గుతుంది.	ముఖ్య ప్రత్యామ్నాయం	ఎంపరర్‌కు ప్రాధాన్యమైనది : సిఫార్సు చేయబడిన వ్యూహం (Recommended Strategy)	ఆచరణలు	ప్రత్యేక అవసరాలు / ఖర్చు (₹/ha)	అవసరమైన ఇన్‌పుట్‌లు	ప్రత్యేక ఉపయోగాలు / ఖర్చు (₹/ha)
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.5-7.0. Avoid waterlogging, as muskmelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	నీరు నిల్వ ఉండని	ఇసుక లోమ్ నుండి లోమ్ నేలలు, బాగా పారుదల ఉన్నవి, సారవంతమైనవి. సేంద్రియ పదార్థం అధికంగా ఉండాలి. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.5-7.0. నీరు నిలిచే పరిస్థితులు నివారించాలి, ఎందుకంటే కస్తూరి పుచ్చకాయ వేర్లు నిస్సారంగా ఉంటాయి మరియు అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటాయి.	నేలలో	ఇసుక లోమ్ నుండి లోమ్ నేలలు, బాగా పారుదల ఉన్నవి, సారవంతమైనవి. సేంద్రియ పదార్థం అధికంగా ఉండాలి. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.5-7.0. నీరు నిలిచే పరిస్థితులు నివారించాలి, ఎందుకంటే కస్తూరి పుచ్చకాయ వేర్లు నిస్సారంగా ఉంటాయి మరియు అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటాయి.	మరియు ప్రత్యామ్నాయం	ఎంపరర్‌కు ప్రాధాన్యమైనది : సిఫార్సు చేయబడిన వ్యూహం (Recommended Strategy)	ఆచరణలు	ప్రత్యేక అవసరాలు / ఖర్చు (₹/ha)	అవసరమైన ఇన్‌పుట్‌లు	ప్రత్యేక ఉపయోగాలు / ఖర్చు (₹/ha)
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	భూమి పరీక్షలు	విత్తడానికి ముందు, పుష్పించే సమయంలో మరియు పండ్లు ఏర్పడే సమయంలో నేల మరియు ఆకు పరీక్షలు చేయించాలి. ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయాలి.	ఇతర పరీక్షలు	EC, pH, OC మరియు స్థూల-సూక్ష్మ పోషక పరిమాణాలను ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నేల పరీక్ష చేయించాలి. పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయాలి. పరీక్షలు పొలం గట్ల వెంట చేయాలి.	ఇతర పరీక్షలు	EC, pH, OC మరియు స్థూల-సూక్ష్మ పోషక పరిమాణాలను ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నేల పరీక్ష చేయించాలి. పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయాలి. పరీక్షలు పొలం గట్ల వెంట చేయాలి.	ఇతర పరీక్షలు	ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకొకసారి నేల పరీక్ష చేయించాలి. ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయాలి. పరీక్షలు పొలం గట్ల వెంట చేయాలి.	ఇతర పరీక్షలు	ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకొకసారి నేల పరీక్ష చేయించాలి. ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయాలి. పరీక్షలు పొలం గట్ల వెంట చేయాలి.	ఇతర పరీక్షలు	
Climate Suitability	Muskmelon is a warm season crop. Optimum temperature: 25-35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	అనువైన వాతావరణం	కస్తూరి పుచ్చ వెచ్చ తేమ కావాలి. దానికి సిగ్ర ఫలదీకరణానికి 25-35 డిగ్రీ సెల్సియస్ కావాలి. అధిక తేమ, మంచు ఉండకూడదు. పొడి, వేడి వాతావరణం పండ్లలో తీపిని పెంచుతుంది.	అనువైన రకాలు	దానిమ్మ పంట అనువైన వాతావరణం కలిగి ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత 25-35 °C. మంచు మరియు అధిక తేమ ఉండకూడదు. పొడి, వేడి వాతావరణం పండ్లలో తీపిని పెంచుతుంది.	వాతావరణ అవసరాలు	కస్తూరి పుచ్చ వెచ్చ తేమ కావాలి. దానికి సిగ్ర ఫలదీకరణానికి 25-35 °C. మంచు మరియు అధిక తేమ ఉండకూడదు. పొడి, వేడి వాతావరణం పండ్లలో తీపిని పెంచుతుంది.	వాతావరణ అవసరాలు	కస్తూరి పుచ్చ వెచ్చ తేమ కావాలి. దానికి సిగ్ర ఫలదీకరణానికి 25-35 °C. మంచు మరియు అధిక తేమ ఉండకూడదు. పొడి, వేడి వాతావరణం పండ్లలో తీపిని పెంచుతుంది.	వాతావరణ అవసరాలు	
Land preparation	Deep ploughing 2-3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8-10 ton FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	భూమి తయారీ	దుక్కి లోతుగా రెండు మూడు సార్లు దున్ని, గొర్రు తోలి నేలను సిద్ధం చేయాలి. ఎకరాకు 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ కలపాలి. బరువు నేలలలో నీరు నిలవకుండా ఉండటానికి బోదెలు లేదా మడులు చేసుకోవాలి.	నేల రకం	లోతుగా దుక్కి దున్నాలి. ఎకరాకు 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ కలపాలి. బరువు నేలలలో నీరు నిలవకుండా ఉండటానికి బోదెలు లేదా మడులు చేసుకోవాలి.	మట్టి రకం	లోతుగా దుక్కి దున్నాలి. ఎకరాకు 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ కలపాలి. బరువు నేలలలో నీరు నిలవకుండా ఉండటానికి బోదెలు లేదా మడులు చేసుకోవాలి.	ముఖ్య పరికరాలు	2-3 సార్లు అడ్డంగా మరియు ఒకసారి పొడవుగా దుక్కులను దున్నాలి. ఎకరాకు 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ కలపాలి. బరువు నేలలలో నీరు నిలవకుండా ఉండటానికి బోదెలు లేదా మడులు చేసుకోవాలి.	ముఖ్య పరికరాలు	
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb, Off-season: Sept-Oct	విత్తే కాలం	రబీ-వేసవి పంట: నవంబర్-ఫిబ్రవరి, ఖరీఫ్-వేసవి: సెప్టెంబర్-అక్టోబర్	విత్తే కాలం	రబీ-వేసవి పంట: నవంబర్-ఫిబ్రవరి, ఖరీఫ్-వేసవి: సెప్టెంబర్-అక్టోబర్	విత్తే కాలం	రబీ-వేసవి పంట: నవంబర్-ఫిబ్రవరి, ఖరీఫ్-వేసవి: సెప్టెంబర్-అక్టోబర్	ముఖ్య కాలం	రబీ-వేసవి పంట: నవంబర్-ఫిబ్రవరి, ఖరీఫ్-వేసవి: సెప్టెంబర్-అక్టోబర్	ముఖ్య కాలం	రబీ-వేసవి పంట: నవంబర్-ఫిబ్రవరి, ఖరీఫ్-వేసవి: సెప్టెంబర్-అక్టోబర్	ముఖ్య కాలం	
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350-400 gm/acre (open field). Sowing: In ridges or raised beds, 1-2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5-0.75 m	విత్తన మోతాదు మరియు అంతరం	విత్తన మోతాదు: ఎకరాకు 350-400 గ్రాములు (బహిరంగ పొలం). విత్తడం: బోదెలు లేదా మడులపై, 1-2 సెం.మీ లోతులో విత్తాలి. విత్తడానికి ముందు నేలను తడపాలి. అంతరం: 2 మీ × 0.5-0.75 మీ.	విత్తన మోతాదు	విత్తన మోతాదు: ఎకరాకు 350-400 గ్రాములు (బహిరంగ పొలం). విత్తడం: బోదెలు లేదా మడులపై, 1-2 సెం.మీ లోతులో విత్తాలి. విత్తడానికి ముందు నేలను తడపాలి. అంతరం: 2 మీ × 0.5-0.75 మీ.	విత్తన మోతాదు	విత్తన మోతాదు: ఎకరాకు 350-400 గ్రాములు (బహిరంగ పొలం). విత్తడం: బోదెలు లేదా మడులపై, 1-2 సెం.మీ లోతులో విత్తాలి. విత్తడానికి ముందు నేలను తడపాలి. అంతరం: 2 మీ × 0.5-0.75 మీ.	విత్తన మోతాదు	
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	విత్తన శుద్ధి	విత్తడానికి ముందు విత్తనాలను కార్బెండజిమ్ @ 2 గ్రా/కిలో చొప్పున శుద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రైకోడెర్మా విరిడి @ 4 గ్రా/కిలో చొప్పున విత్తనాలు శుద్ధి చేయాలి.	విత్తన శుద్ధి	విత్తడానికి ముందు విత్తనాలను కార్బెండజిమ్ @ 2 గ్రా/కిలో చొప్పున శుద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రైకోడెర్మా విరిడి @ 4 గ్రా/కిలో చొప్పున విత్తనాలు శుద్ధి చేయాలి.	శిలీంధ్ర నివారిణి	విత్తడానికి ముందు విత్తనాలను కార్బెండజిమ్ @ 2 గ్రా/కిలో చొప్పున శుద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రైకోడెర్మా విరిడి @ 4 గ్రా/కిలో చొప్పున విత్తనాలు శుద్ధి చేయాలి.	శిలీంధ్ర నివారిణి	విత్తడానికి ముందు విత్తనాలను కార్బెండజిమ్ @ 2 గ్రా/కిలో చొప్పున శుద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రైకోడెర్మా విరిడి @ 4 గ్రా/కిలో చొప్పున విత్తనాలు శుద్ధి చేయాలి.	శిలీంధ్ర నివారిణి	
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–4 weeks. Use shallow hoeing, intercultural operations, or mulching. Two to three weedings may be required.	కలుపు నివారణ పద్ధతులు	మొదటి 3-4 వారాలు పంట చేను కలుపు లేకుండా చూడాలి. దంతి లేదా గొర్రు, మరియు అంతర కార్యకలాపాలు లేదా మల్చింగ్ ద్వారా కలుపును నివారించాలి. మొత్తం రెండు లేదా మూడు సార్లు కలుపు తీయాలి.	కలుపు నివారణ	మొదటి 3-4 వారాలు పంట చేను కలుపు లేకుండా చూడాలి. దంతి లేదా గొర్రు, మరియు అంతర కార్యకలాపాలు లేదా మల్చింగ్ ద్వారా కలుపును నివారించాలి. మొత్తం రెండు లేదా మూడు సార్లు కలుపు తీయాలి.	ముఖ్య పద్ధతులు	మొదటి 3-4 వారాలు పంట చేను కలుపు లేకుండా చూడాలి. దంతి లేదా గొర్రు, మరియు అంతర కార్యకలాపాలు లేదా మల్చింగ్ ద్వారా కలుపును నివారించాలి. మొత్తం రెండు లేదా మూడు సార్లు కలుపు తీయాలి.	కలుపు నివారణ	
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical (kg/acre): Urea –130 kg, SSP –155 kg, MOP –48 kg. Apply CAN @ 4, 6, 10 DAS. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2–3 g/L at 15–20 DAS; 0:0:50 + Hexaconazole @ 25 ml/15 L at 50 DAS for later development and disease protection.	ఎరువుల యాజమాన్యం	తోటలో ఎరువులు వేయడానికి ముందే 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ వేయాలి. రసాయనిక ఎరువులు: యూరియా –110 కిలోలు, సూపర్ ఫాస్ఫేట్ –625 కిలోలు, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ –80 కిలోలు. నత్రజనిని రెండు సమభాగాలుగా చేసి పూత మరియు పిందె దశలలో వేయాలి.	ఎరువుల యాజమాన్యం	తోటలో ఎరువులు వేయడానికి ముందే 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ వేయాలి. రసాయనిక ఎరువులు: యూరియా –110 కిలోలు, SSP –155 కిలోలు, MOP –48 కిలోలు. నత్రజనిని రెండు సమభాగాలుగా చేసి పూత మరియు పిందె దశలలో వేయాలి. పిందె రాలడం తగ్గించడానికి 0.5% బోరాక్స్ పిచికారీ చేయాలి.	ఎరువుల యాజమాన్యం	తోటలో ఎరువులు వేయడానికి ముందే 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ వేయాలి. రసాయనిక ఎరువులు: యూరియా –110 కిలోలు, SSP –155 కిలోలు, MOP –48 కిలోలు. నత్రజనిని రెండు సమభాగాలుగా చేసి పూత మరియు పిందె దశలలో వేయాలి. పిందె రాలడం తగ్గించడానికి 0.5% బోరాక్స్ పిచికారీ చేయాలి.	ఎరువుల యాజమాన్యం	
Irrigation Management	Uniform irrigation; avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3–4 days before harvest to improve sweetness.	నీటి యాజమాన్యం	నాటిన తొలి దశలో నీరు తరచుగా ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత పంట ఎదిగే దశలో, పూత మరియు పిందె దశలలో నీరు సమృద్ధిగా అందించాలి. కాయలు పక్వానికి వచ్చే సమయంలో నీరు ఇవ్వడం తగ్గించాలి.	నీటి యాజమాన్యం	నాటిన తొలి దశలో నీరు తరచుగా ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత పంట ఎదిగే దశలో, పూత మరియు పిందె దశలలో నీరు సమృద్ధిగా అందించాలి. కాయలు పక్వానికి వచ్చే సమయంలో నీరు ఇవ్వడం తగ్గించాలి.	నీటిపారుదల యాజమాన్యం	నాటిన తొలి దశలో నీరు తరచుగా ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత పంట ఎదిగే దశలో, పూత మరియు పిందె దశలలో నీరు సమృద్ధిగా అందించాలి. కాయలు పక్వానికి వచ్చే సమయంలో నీరు ఇవ్వడం తగ్గించాలి.	నీటిపారుదల యాజమాన్యం	
Pest Management	Aphids & Thrips: Thiamethoxam @ 5 gm/15 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 9 ml/15 L. Fruit Fly: Remove infested fruits; Neem-seed kernel extract 5%; Methyl eugenol traps; repeat Malathion + Jaggery solution 3–4 times at 10 day intervals.	పురుగు మరియు తెగుళ్ల యాజమాన్యం	థయామెథాక్సామ్ @ 5 గ్రా/15 లీటర్ నీటికి, లీమ్ మైనర్: అబామెక్టిన్ @ 9 మి.లీ/15 లీటర్, ఫ్రూట్ ఫ్లై: ఎర కొమ్మలను తొలగించాలి; వేప గింజల కషాయం 5%; మిథైల్ యూజినాల్ ఎరలు; మలాథియాన్ + బెల్లం ద్రావణాన్ని 10 రోజుల వ్యవధిలో 3-4 సార్లు పిచికారీ చేయాలి.	పురుగు మరియు తెగుళ్ల యాజమాన్యం	ఆకు ముడత పురుగు: థయామెథాక్సామ్ @ 5 గ్రా/15 లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పండు ఈగ: ఎర కొమ్మలను తొలగించాలి; మిథైల్ యూజినాల్ ఎరలు 10 సంఖ్యలు/ఎకరా; మలాథియాన్ + బెల్లం ద్రావణాన్ని 10 రోజుల వ్యవధిలో 3-4 సార్లు పిచికారీ చేయాలి.	పురుగు మరియు తెగుళ్ల యాజమాన్యం	థయామెథాక్సామ్ @ 5 గ్రా/15 లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పండు ఈగ: ఎర కొమ్మలను తొలగించాలి; మిథైల్ యూజినాల్ ఎరలు 10 సంఖ్యలు/ఎకరా; మలాథియాన్ + బెల్లం ద్రావణాన్ని 10 రోజుల వ్యవధిలో 3-4 సార్లు పిచికారీ చేయాలి.	పురుగు మరియు తెగుళ్ల యాజమాన్యం	
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 g/10 L, 2–3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM; spray systems + soaker fungicide when needed.	తెగుళ్ల యాజమాన్యం	బూడిద తెగులు: 20 గ్రా/10 లీటర్ నీటిలో 10 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 సార్లు పిచికారీ చేయాలి. డౌనీ బూజు: మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% WP @ 2 గ్రా/లీటర్. ఆకుమచ్చ వ్యాధి: ట్రైకోడెర్మా విరిడి 1 కేజీ + 50 కేజీల పశువుల ఎరువులో కలిపి వేయాలి. అవసరమైతే పిచికారీ చేయాలి.	తెగుళ్ల యాజమాన్యం	భూమి ప్రక్షాళనకు: వేపిన కాయపుచెక్కపొడి లేదా కానుగపొడి 20 కిగ్రా/10 లీటర్లు, 10 క్రాస్-బార్ ట్రెల్లిస్ చేయాలి. 2-3 పూతదశ: ప్రొపినెబ్ 70% + డైమెథోమార్ఫ్ 10% WP @ 2 గ్రా/లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.	తెగుళ్ల యాజమాన్యం	భూమి ప్రక్షాళనకు: వేపిన కాయపుచెక్కపొడి లేదా కానుగపొడి 20 కిగ్రా/10 లీటర్లు, 10 క్రాస్-బార్ ట్రెల్లిస్ చేయాలి. 2-3 పూతదశ: ప్రొపినెబ్ 70% + డైమెథోమార్ఫ్ 10% WP @ 2 గ్రా/లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.	తెగుళ్ల యాజమాన్యం	
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Muskmelon gives average 14-15 ton fruits per acre.	కోత తర్వాత పంట	పక్వత దశ: కాయలు పూర్తిగా పండి, తీగ నుండి సులభంగా వేరు అయ్యే దశలో కోయాలి. ఎకరాకు 14-15 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది.	కోత తర్వాత పంట	పక్వత దశ: కాయలు పూర్తిగా పండి, తీగ నుండి సులభంగా వేరు అయ్యే దశలో కోయాలి. ఎకరాకు 14-15 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది.	కోత తర్వాత పంట	పక్వత దశ: కాయలు పూర్తిగా పండి, తీగ నుండి సులభంగా వేరు అయ్యే దశలో కోయాలి. ఎకరాకు 14-15 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది.	కోత తర్వాత పంట	
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	కోత తర్వాత యాజమాన్యం & నిల్వ	కాయలను కోసిన తర్వాత చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. పరిమాణం, నాణ్యతను బట్టి గ్రేడింగ్ చేయాలి. సిఫార్సు చేసిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద పండ్లను నిల్వ చేయాలి, రవాణా చేయాలి.	కోత తర్వాత యాజమాన్యం	కాయలను కోసిన తర్వాత చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. పరిమాణం, నాణ్యతను బట్టి గ్రేడింగ్ చేయాలి. సిఫార్సు చేసిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద పండ్లను నిల్వ చేయాలి, రవాణా చేయాలి.	ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు	కాయలను కోసిన తర్వాత చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. పరిమాణం, నాణ్యతను బట్టి గ్రేడింగ్ చేయాలి. సిఫార్సు చేసిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద పండ్లను నిల్వ చేయాలి, రవాణా చేయాలి.	ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు	
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	అనుబంధం	ఈ సిఫారసులు రాష్ట్ర అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలు మరియు ట్రయల్ కేంద్రాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట యాజమాన్య పద్ధతులపై ఆధారపడి మారవచ్చు.	అనుబంధం	ఈ సిఫారసులు రాష్ట్ర అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలు మరియు ట్రయల్ కేంద్రాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట యాజమాన్య పద్ధతులపై ఆధారపడి మారవచ్చు.	అనుబంధం	ఈ సిఫారసులు రాష్ట్ర అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలు మరియు ట్రయల్ కేంద్రాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట యాజమాన్య పద్ధతులపై ఆధారపడి మారవచ్చు.	అనుబంధం	