PRACTICES	HYBRID WATERMELON (SISCO KESHRI)	मराठीमध्ये	मुख्यमंत्री उपमुख्य (जिल्हाचे पिकाचे)	ગુજરાતમાં	સ્થાનિક નામ (કિસી કિસી)	ಇದರಿಂದ	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು (ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆ)	ઉપમુખ્યમંત્રી	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆ)	ಸಾಮೂಹಿಕ	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ (ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆ)	ಸಾಮೂಹಿಕ	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ (ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	पेरणीपूर्वी मागील पिकाचे अवशेष, तण, जुने वेल आणि रोगग्रस्त/खराब झालेले वनस्पती साहित्य काढा. कीड आणि रोगांचे संक्रमण कमी करण्यासाठी शेताच्या सीमा स्वच्छ ठेवा.	ખેતરમાં પાછલા પાકના અવશેષો, નકામું, જૂની વેલ અને રોગગ્રસ્ત/નુકસાનગ્રસ્ત છોડની સામગ્રી વાવણી પહેલાં દૂર કરો. જીવાત અને રોગના સંક્રમણને ઘટાડવા માટે ખેતરની સીમાઓ સ્વચ્છ રાખો.	ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷ, ಕಳೆ, ಹಳೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.	ખેત સફાઈ	ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ (ಸಿಸ್ಕೊ ಕೇಶರಿ)	ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ (ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ)	ಸಂಘದ ಹೆಸರು (ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ)	ಸಂಘದ ಹೆಸರು (ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ)
Soil requirement	Sandy loam to loam soils, well-drained, fertile, rich in organic matter. Ideal pH: 6.0–7.0. Avoid waterlogging as watermelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	चांगला निचरा होणारी, सुपीक, सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध वाळू ते चिकणमाती माती. आदर्श pH: 6.0–7.0. कलिंगडाच्या मुळांचे खोल नसल्यामुळे आणि ते जास्त ओलाव्याला संवेदनशील असल्यामुळे पाणी साचणे टाळा.	ખેતરમાં પાણી ન ભરાય તેવી, સારી રીતે નિકાલ થતી, ફળદ્રૂપ, સેંદ્રિય પદાર્થથી સમૃદ્ધ રેતાળ દોમટ થી ચીકણી માટી. આદર્શ pH: 6.0–7.0. પાણી ભરાવાનું ટાળો કારણ કે તરબૂચના મૂળ છીછરા અને વધુ પડતા ભેજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે.	ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH: 6.0–7.0. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	जिल्ह्याची मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा (जीपीएल) और कृषि-कृषक संपर्क केंद्र (एकेएसके) के माध्यम से मृदा नमूने एकत्र करें। ईसी, पीएच, ओसी और मैक्रो-माइक्रो पोषक तत्वों के लिए हर 2-3 साल में एक बार मिट्टी का परीक्षण करें और परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरक लगाएं।	EC, pH, OC અને મેક્રો-માઈક્રો પોષક તત્વો માટે દર 2-3 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી એકવાર માટી પરીક્ષણ કરો અને પરીક્ષણ પરિણામોના આધારે ખાતર નાખો.	ಇಸಿ, ಪಿಹೆಚ್, ಒಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
Climate Suitability	Watermelon is a warm-season crop. Optimum temperature: 25–35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	उबदार ऋतूतील पीक. इष्टतम तापमान: २५-३५ डिग्री सेल्सियस. दंव आणि जास्त आर्द्रता टाळा. कोरडे, उष्ण हवामान फळांचा गोडवा वाढवते.	તરબૂચ ગરમ ઋતુનો પાક છે. શ્રેષ્ઠ તાપમાન: 25-35 °C. ઠંડા અને ઉચ્ચ ભેજ ટાળો. સૂકા, ગરમ હવામાન ફળની મીઠાશ સુધારે છે.	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ. ಇಷ್ಟತಮ ತಾಪಮಾನ: 25-35 °C. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಣ, ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನವು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.	ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ	ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ	ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ	ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ	ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ
Land preparation	Deep ploughing 2–3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8–10 tons FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	खोल नांगरणी 2-3 वेळा आणि त्यानंतर बारीक मशागत करा. प्रति एकर 8-10 टन शेणखत किंवा कंपोस्ट मिसळा. चांगल्या निचऱ्यासाठी, विशेषतः जड जमिनीत, रिजर्स किंवा उंचावलेले वाफे तयार करा.	ઊંડી ખેડ 2-3 વખત કરો અને ત્યાર બાદ સારી માટી તૈયાર કરવા માટે હેરો. પ્રતિ એકર 8-10 ટન સેંદ્રિય ખાતર અથવા ખાતર ઉમેરો. સારી નિકાલ માટે, ખાસ કરીને ભારે જમીનમાં, રિજ અથવા ઉંચા વાફા બનાવો.	ಆಳ ಉಳುಮೆ 2-3 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹರಗುವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಎಫ್‌ವೈಎಂ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು/ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov–Feb. Off-season: Sept–Oct	उन्हाळा-शरदऋतूतील पीक: नोव्हेंबर-फेब्रुवारी. ऑफ-सीझन: सप्टेंबर-ऑक्टोबर	વસંત-ઉનાળાનો પાક: નવેમ્બર-ફેબ્રુવારી. ઓફ-સીઝન: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર	ವಸಂತ-ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.	ಕೇಶರಿ ಬೆಳೆ	ಕೇಶರಿ ಬೆಳೆ	ಕೇಶರಿ ಬೆಳೆ	ಕೇಶರಿ ಬೆಳೆ	ಕೇಶರಿ ಬೆಳೆ
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350–400 grams/acre (open-field). Seeding: In ridges or raised beds, 1–2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5–0.75 m	बियाणे दर: ३५०-४०० ग्रॅम/एकर (खुलेत). पेरणी: २ फूट रुंद, पट्टी पाडलेल्या वाफ्यात दोन ओळीमध्ये. बरा उगवण्यासाठी जमीनीला पूर्व-सिंचन करावे. अंतर: २ मीटर × ०.५-०.७५ मीटर	બિયારણ દર: 350-400 ગ્રામ/એકર (ખેતરમાં વેરણ). વાવણી: ખાંચામાં અથવા ઉંચા વાફામાં, 1-2 સેમી ઊંડાઈ. ઉગવાના સારા પરિણામો માટે જમીનને પૂર્વ-સિંચાઈ આપો. અંતર: 2 મીટર × 0.5-0.75 મીટર	ಬೀಜದ ದರ: 350-400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ತೆರೆದ ಹೊಲ). ಬಿತ್ತನೆ: ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ವ-ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಅಂತರ: 2 ಮೀ × 0.5-0.75 ಮೀ.	ಬೀಜದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	बुरशी व गंज टाळण्यासाठी बियाणे कार्बेंडाझिम @ २ ग्रॅम/किलो बियाणे आणि ट्रायकोडर्मा विरिडे @ ४ ग्रॅम/किलो बियाणे वापरून बीजप्रक्रिया करावी.	બુરશી અને કાટ ટાળવા માટે બિયારણને કાર્બેન્ડાઝિમ @ 2 ગ્રામ/કિલો બીજ સાથે સારવાર કરો. ત્યાર બાદ ટ્રાઈકોડર્મા વિરિડે @ 4 ગ્રામ/કિલો બીજ સાથે સારવાર કરી શકાય છે.	ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು.	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–6 weeks. Use shallow hoeing, mechanical operations, or mulching. Two to three weedings may be required.	पहिले ३-४ आठवडे तण मुक्त क्षेत्र ठेवा. उथळ खुरपणी, यांत्रिक कामे किंवा मल्चिंग वापरा. दोन ते तीन खुरपणी आवश्यक असू शकतात.	પહેલાં 3-4 અઠવાડિયા દરમિયાન ખેતરને નીંદણમુક્ત રાખો. ઉથલ ખુરપણી, યાંત્રિક કામગીરી અથવા મલ્ચિંગનો ઉપયોગ કરો. 2-3 નીંદણની જરૂર પડી શકે છે.	ಮೊದಲ 3-4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಮುಕ್ತ ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕುವಿಕೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿ. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea ~110 kg, SSP ~155 kg, MOP ~40 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing; remaining N along vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2–3 g/L at 30–35 DAS; 0:0:50 + Boronutrients @ 25 and 50 days.	शेणखत/कंपोस्ट: पेरणीपूर्वी ८-१० टन. रासायनिक खते: युरिया ~११० किलो, एसएसपी ~१५५ किलो, एमओपी ~४० किलो. पेरणीवेळी पूर्ण फॉस्फरस आणि पोटॅश + १/३ नत्रापैकी नत्र; उरलेले नत्र वेल वाढताना आणि फळ धरताना द्यावे. पर्णफवारणी: १९:१९:१९ + सूक्ष्मअन्नद्रव्ये @ २-३ ग्रॅम/लिटर, ३०-३५ दिवसांनंतर; ०:०:५० + बिगरअन्नद्रव्ये @ २५ आणि ५० दिवसांनंतर.	સેન્દ્રિય ખાતર અથવા કમ્પોસ્ટ: વાવણી પહેલાં 8-10 ટન/એકર. રાસાયણિક ખાતર: યુરિયા ~110 કિલો, SSP ~155 કિલો, MOP ~40 કિલો. વાવણી સમયે સંપૂર્ણ ફોસ્ફરસ અને પોટાશ + 1/3 નાઈટ્રોજન; બાકીના નાઈટ્રોજન વેલના વિકાસ દરમિયાન અને ફળ બેસતી વખતે આપવો. પર્ણસંભાળ: 19:19:19 + માઈક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ @ 2-3 ગ્રામ/લિટર, 30-35 DAS; 0:0:50 + બોરોનયુક્ત ખાતરો @ 25 અને 50 દિવસે.	ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ	ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ	ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ	ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ	ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ
Irrigation Management	Uniform irrigation, avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3–4 days before harvest to improve sweetness.	नियमित सिंचाई करा; पाणी ताण आणि साचलेपणा टाळा. उन्हाळ्यात: वाळू असलेल्या जमिनीत आठवड्यातून एकदा किंवा त्यापेक्षा जास्त. काढणीपूर्वी ३-४ दिवस सिंचाई थांबवा किंवा कमी करा.	નિયમિત સિંચાઈ કરો; પાણીની તાણ અને પાણી ભરાવાનું ટાળો. ઉનાળામાં: રેતાળ જમીનમાં અઠવાડિયામાં એક વાર કે તેથી વધુ વાર. મીઠાશ સુધારવા માટે લણણીના 3-4 દિવસ પહેલાં પિયત ઓછું કરો અથવા બંધ કરો.	ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ; ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ: ಮರಳು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು. ಸಿಹಿತನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ/ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
Pest Management	Aphids & Thrips: Thamethoxam @ 5 gm/10 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/10 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Neem-based (oil/cake) 10 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 5-7 times at 10 day intervals.	मावा आणि थ्रिप्स: थायमेथॉक्सम @ ५ ग्रॅम/१० लिटर पाणी; तीन वापर. पानांचा खोडकर: अबामेक्टिन @ ६ मिली/१० लिटर; फळ माशी: संक्रमित फळे नष्ट करा; कडुनिंब तेल/केक १० ग्रॅम/लिटर पाण्यात, मलॅथिऑन + गुळाचे द्रावण ५-७ वेळा/१० दिवस.	મોલો અને થ્રિપ્સ: થાયમેથોક્સમ @ 5 ગ્રામ/10 લિટર પાણી. પાન ખોદનાર: એબામેક્ટિન @ 6 મિલી/10 લિટર. ફળની માખી: સંક્રમિત ફળો નષ્ટ કરો. લીમડા તેલ/કેક આધારિત (10 ગ્રામ/લિટર પાણી) + મલાથિયન + ગોળનું દ્રાવણ 5-7 વખત/10 દિવસના અંતરાલે 3-4 વખત પુનરાવર્તન કરો.	ಮಾವು ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್: ಥಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 5 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು. ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವವರು: ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 6 ಮಿಲಿ/10 ಲೀ. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ: ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಬೇವು ಆಧಾರಿತ (ಎಣ್ಣೆ/ಕೇಕ್) 10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು, ಮಲಾಥಿಯಾನ್ + ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣ 5-7 ಬಾರಿ 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Watermelon gives average 25-28 ton fruits per acre.	अर्धा-स्लिप स्टेज (स्थानिक बाजार) या परिपक्व हरा स्टेज (लांब वाहतूक). कलिंगडाचे सरासरी २५-२८ टन फळ प्रति एकर.	અર્ધ-સ્લિપ સ્ટેજ (સ્થાનિક બજાર) અથવા પરિપક્વ-લીલો સ્ટેજ (લાંબા અંતર). તરબૂચ પ્રતિ એકર સરેરાશ 25-28 ટન ફળ આપે છે.	ಅರ್ಧ-ಸ್ಲಿಪ್ ಹಂತ (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢ-ಹಸಿರು ಹಂತ (ದೀರ್ಘ ಸಾಗಣೆ). ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 25-28 ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	कलिंगड हे काढल्यानंतर थंड जागेत ठेवा. आकार आणि गुणवत्तेनुसार श्रेणीबद्ध करा. शिफारस केलेल्या तापमानात फळांची साठवणूक आणि वाहतूक करा.	કાપણી પછી કલિંગડાને ઠંડી જગ્યાએ સંગ્રહિત કરો. કદ અને ગુણવત્તા પ્રમાણે ગ્રેડ કરો. ભલામણ કરેલ તાપમાને ફળનો સંગ્રહ અને પરિવહન કરો.	ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಿ.	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ
Disclaimer	These recommendations are based on SAU, government agencies, and trial content. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ही शिफारशी स्थानिक कृषी विद्यापीठे और परीक्षण केंद्रों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणामों में मौसम, जलवायु, किस्म और फसल स्वास्थ्य पद्धतियों के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	આ ભલામણો SAU, સરકારી એજન્સીઓ અને ટ્રાયલ સેન્ટરો પર આધારિત છે. વાસ્તવિક પરિણામો જમીનના પ્રકાર, આબોહવા, વિવિધતા અને પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના આધારે અલગ અલગ હશે.	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕೃತಿ	ಅಸ್ವೀಕೃತಿ	ಅಸ್ವೀಕೃತಿ	ಅಸ್ವೀಕೃತಿ	ಅಸ್ವೀಕೃತಿ