PRACTICES	HYBRID TOMATO (ISSCO SARASWATI)	ಅಭ್ಯಾಸಗಳು	ಮರಿಗೆ ಸಾಲು / ಗಿಡದ ಅಂತರ (	ಮರಿಗೆ ಸಾಲು / ಗಿಡದ ಅಂತರ (	ಅಭ್ಯಾಸ	ಹೂವು ಮೊಗ್ಗಾಗುವಿಕೆ	ಮರಿಗೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ (ಗಿಡಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು)	ಅಭ್ಯಾಸ	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಳೆ ಎಳೆಯುವಿಕೆ)	ಅಭ್ಯಾಸ	ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಭೂತ (ಕಳೆ ಎಳೆಯುವಿಕೆ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.5. Avoid waterlogging to prevent root and stem rot.	ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸಾಕಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಇರುವ ಸಿಹಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸಾಕಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಇರುವ ಸಿಹಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು, ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸಾಕಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಇರುವ ಸಿಹಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
Climate Suitability	Climate Requirement: Thrives in warm crop. Optimum temperature: 21-23 °C for fruit setting. Suitable range: 20-27 °C. Avoid high humidity and frost conditions.	ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸಾಕಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಇರುವ ಸಿಹಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
Land preparation	Land Preparation: 2-3 deep ploughings followed by harrowing to make a fine tilth. Incorporate 5-10 tons of well-decomposed FYM per acre during the final ploughing. Raised beds or ridges recommended in heavy soils for good drainage.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Sowing Time	Sowing Time / Season: • North India: July–August (Kharif) and November–December (Rabi). • South India: June–July, October–November, January–February. Seedlings ready for transplanting 25–30 days after sowing.	ಹೂವಿನ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing: Seed rate: 80–100 g per acre (open pollinated) or 20–40 g (hybrid). Raise nursery beds (1 m width, 15 cm height) treated with Trichoderma/FYM mix, transplant healthy seedlings. Spacing: 2–2.5 feet between rows × 1–1.5 ft between plants (~10,000–20,000 plants/acre).	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Seed Treatment	Seed Treatment / Vaccinate: • Seed treat with Trichoderma viride @ 5 g per 100 g seed or Thiram/Captan @ 2 g/kg seed. Nursery soil may be enhanced and treated with Trichoderma @ 50 g/m² or pressure dampening-off.	ಹೂವಿನ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Weed Management	Weed Control: Hand weed twice for the first 45 days. Manual hoeing at 30 and 45 days after transplanting. Mulching with black polyethylene or straw reduces weeds and conserves moisture.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management (Per Acre): Basal Dose (Before Transplanting): • Farmyard manure: 8–10 tonnes/acre • Urea: 10 kg (~22 kg N) • SSP: 125 kg (~18 kg P₂O₅) • MOP: 30 kg (~18 kg K₂O) Top Dressing: • 25 kg Urea after 30 days of transplanting • 25 kg Urea after 60 days of transplanting. Apply fertilizers 5–6 inches away from root zone, followed by light irrigation. (Equivalent to 120:60:60 kg N:P₂O₅:K₂O)	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Irrigation Management	Irrigation Management: Light irrigation immediately after transplanting. During vegetative growth: every 3–5 days (light soil) or 7 days (heavy soil). Flowering & fruiting: regular irrigation at 5–7 day intervals to maintain moisture. Avoid over-irrigation at ripening stage to reduce fruit cracking. Drip irrigation improves yield and water use efficiency.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Pest Management	Pest Management: 1. Fruit borer (Helicoverpa armigera): Spray Emamectin benzoate 5 SG @ 0.4 g/L or Spinosad 45 SC @ 0.3 ml/L or Spinosad 25% SC @ 90 ml/acre. 2. Whitefly & Aphids: Use Yellow Sticky Traps (8–10/acre). Spray Imidacloprid 17.8% SL @ 50 ml/acre or Neem oil 2% (at 15–21 day intervals). 3. Thrips / Leaf Miner: Use Blue Sticky Traps (8–10/acre). Spray Fipronil 5% SC @ 300 ml/acre or Acephate 75% SP @ 400 g/acre.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Disease Management	Disease Management: 1. Damping-Off: Drench nursery beds with Copper oxychloride @ 2.5 g/1.95 L water or Mancozeb 0.25% (2.5 g/L). 2. Early Blight (Alternaria solani): Spray Mancozeb 0.25% or Chlorothalonil 0.2% at 10–15 day intervals. 3. Late Blight (Phytophthora infestans): Spray Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil Gold) 0.25% at first sign. 4. Bacterial Wilt: Use resistant varieties, avoid solanaceous crops in rotation, and ensure good drainage. 5. Leaf Curl / Mosaic Virus: Control whiteflies with Imidacloprid 0.3 ml/L water, remove infected plants.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield: First picking starts 70–80 days after transplanting. Pick fruits at breaker or orange green stage for long shelf life. Average yield: 20–25 tonnes/acre. Expected yield: 150–200 quintals/acre (fresh fruit).	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling: Sort and grade fruits by size and color. Pack in ventilated crates. Pre-cool before transport. Store at 12–13 °C and 85–90% RH for longer shelf life.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
Disclaimer	These recommendations are based on KAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆ	ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳೆತ ಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ	ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ