PRACTICES	HYBRID MUSKMELON (SISCO SITARA)	ಅವಲೋಕನ	ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)	ಅವಲೋಕನ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)	ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಅವಲೋಕನ	ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)	ಅವಲೋಕನ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)	ಅವಲೋಕನ	ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನ (ಸೀಸನ್ ವಿಸ್ತಾರ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**ಹೊಲ ಶುಚಿ**	ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಳು ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯಬಳ್ಳಿ, ಗುರುತು ಕಳೆದ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಲದ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ.	**ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆ**	ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.	**ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ**	ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ.	**ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ**	ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಕಳಪೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.5-7.0. Avoid waterlogging, as muskmelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	**ಮಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ**	ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲವತ್ತಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.5-7.0. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.	**ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ**	ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತ.	**ಮಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ**	ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 6.5-7.0. ಮುಸುಕಿನಜೊಳ್ಳದ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ**	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಿ.	**ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ**	EC, pH, OC ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಿ.	**ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ**	EC, pH, OC ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಸ್ಥೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿರಿ.	**ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ**	ಪ್ರತಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಿ.
Climate Suitability	Muskmelon is a warm season crop. Optimum temperature: 25-35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	**ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ**	ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತ. ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತ.	**ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತತೆ**	ಮುಸುಕಿನಜೊಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ: 25-35 °C. ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಒಣ, ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.	**ಹವಾಮಾನ ಆಯ್ಕೆ**	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನ ಹಂಗಾಮದ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ: 25-35 °C. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಒಣ, ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Land preparation	Deep ploughing 2-3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8-10 ton FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	**ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ**	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ.	**ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ**	2-3 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುವುದು ಮತ್ತು ಹರಗುವುದು. ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಳೆತ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಭಾರೀ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ.	**ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ**	2-3 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುವುದು ಮತ್ತು ಹರಗುವುದು. ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಳೆತ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಭಾರೀ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ.
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb, Off-season: Sept-Oct	**ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ**	ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.	**ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ**	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಸನ್: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.	**ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ**	ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350-400 grams/acre (open field). Sowing: In ridges or raised beds, 1-2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5-0.75 m	**ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅಂತರ**	ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಇಳುವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಬೀಜ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ**	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತರ.	**ಬೀಜ ದರ**	ಎಕರೆಗೆ 350-400 ಗ್ರಾಮ (ಸರಿಯಾದ ಮೊಳಕೆ).
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	**ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ**	ಬೀಜ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆ ಖಾತ್ರಿ.	**ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ**	ಬೀಜ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆ ಖಾತ್ರಿ.	**ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ**	ಬೀಜ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆ ಖಾತ್ರಿ.
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–4 weeks. Use shallow hoeing, intercultural operations, or mulching. Two to three weedings may be required.	**ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಮುಕ್ತ ಹೊಲ ಇಳುವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಆರಂಭದ 3-4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಮುಕ್ತ ಹೊಲ ಇಳುವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕುವುದು, ಅಂತರಬೇಸಾಯ ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿರಿ. 2-3 ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.	**ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಮೊದಲ 3-4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ರಹಿತ ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕುವುದು, ಅಂತರಬೇಸಾಯ ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿರಿ. 2-3 ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea –130 kg, SSP –155 kg, MOP –40 kg. Apply 50% N and full P & K at sowing. Top-dressing N during vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + nanoparticles @ 2-3 g/L at 10–15 DAS; 0:0:50 + Humasonnets @ 25 ml/15 L at 55 DAS for faster development and disease protection.	**ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಪೋಷಕಾಂಶ**	ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Irrigation Management	Uniform irrigation; avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3-4 days before harvest to improve sweetness.	**ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ನೀರಾವರಿ**	ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Pest Management	Aphids & Thrips: Thiamethoxam @ 5 gm/15 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 8 ml/15 L. Fruit Fly: Remove infested fruits; Neem-seed kernel extract 5% + jaggery solution. Powdery mildew: report Medahilos + Jaggery solution 3-4 times at 10 day intervals.	**ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಕೀಟ**	ಸರಿಯಾದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 g/10 L, 2-3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging; Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM; spray systemic + contact fungicide when needed.	**ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ**	ಸರಿಯಾದ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ರೋಗ**	ಸರಿಯಾದ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Muskmelon gives average 14-15 ton fruits per acre.	**ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ**	ಸರಿಯಾದ ಕಟಾವು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ**	ಸರಿಯಾದ ಕಟಾವು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.	**ಕಟಾವು**	ಸರಿಯಾದ ಕಟಾವು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	**ಕಟಾವು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ**	ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ.	**ಕಟಾವು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ**	ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ.	**ಕಟಾವು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ**	ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ.
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	**ಅಸ್ವೀಕಾರ**	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	**ಅಸ್ವೀಕಾರ**	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	**ಅಸ್ವೀಕಾರ**	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.