PRACTICES	HY.CUCUMBER (SISCO WINTER VALLY)														
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**ஒரு வீட்டு**	ஒழுங்கு செய்த பிறகான விதைப்பு வரை, பழைய பயிர் எச்சங், களைகள், பழுதான கொடிகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதுமான தாவர பொருட்களை அகற்ற வேண்டும். வயலின் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுதலை குறைக்க உதவும்.	**பிரபாகரன் பாலை**	வெளியேறிய பயிர்களின் எச்சங்கள், களைகள், பழைய கொடிகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதுமான தாவர பொருட்கள் ஆகியவை விதைக்கு முன்னர் அகற்ற வேண்டும். வயல் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுதலை குறைக்க உதவும்.	**Alp Innovations**	பழைய பயிர் எச்சங்கள், களைகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதுமான தாவர பொருட்கள் ஆகியவை விதைக்கு முன்னர் அகற்ற வேண்டும். வயல் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுதலை குறைக்க உதவும்.	**ஜீவி சூர்யகாந்த்**	பயிர் எச்சங்கள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதுமான தாவர பொருட்கள் ஆகியவை விதைக்கு முன்னர் அகற்ற வேண்டும். வயல் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுதலை குறைக்க உதவும்.
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	**சிவபதி வி அமரவாணி**	மணல் கலந்த வண்டல் மண் முதல் வண்டல் மண் வரை, நல்ல வடிகால் வசதியுடன், வளமானவை, மற்றும் சிறந்த கரிமச்சத்துக்கள் கொண்ட மண் உகந்த pH அளவு: சுமார் 6.0-7.0. வெள்ளநீர்க்கால் அதிகப்படியான ஈரப்பத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய கிழங்கு என்பதாலும், நீர் தேக்கங்களைத் தவிர்க்கவும்.	**Rao ஸ்மார்ட்**	வளங்கி யாட்ச வகைப்பூமி கொட. சீரிய நைமைக்கு ஏற்ற கிழங்கு வகை. வளமுள்ள மண்ணாக, நல்ல வடிகால் வசதியுடன் மிதமான அமிலத்தன்மை கொண்ட மண்ணாக இருக்க வேண்டும்.	**கார்த்தி வாசுதேவன்**	வளங்கி யாட்ச வகைப்பூமி கொட. சீரிய நைமைக்கு ஏற்ற கிழங்கு வகை. வளமுள்ள மண்ணாக, நல்ல வடிகால் வசதியுடன் மிதமான அமிலத்தன்மை கொண்ட மண்ணாக இருக்க வேண்டும்.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**சூர்ய பரிமளா**	மேற்கூறிய 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாவது EC, pH, OC மற்றும் பேரூட்டச்சத்துக்கள், நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் ஆகியவற்றுக்காக மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	**சுமதி பரிமளா**	EC, pH, OC மற்றும் நுண்-பெரு சோதனை மேற்கொள்ளுங்கள் கடைசி 2-3 மதங்களிலாவது மண்ணை சோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	**சுமதி பரிமளா**	EC, pH, OC மற்றும் நுண்-பெரு சோதனை மேற்கொள்ளுங்கள் கடைசி 2-3 மதங்களிலாவது மண்ணை சோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement: Temperature: Optimum 25 – 35 °C. Rainfall: 120-150 mm is suitable for the crop. Sowing temperature: 22-30 °C	**பாலமுரு மனோகரன்**	பகல்நேர / இரவுநேர வெப்பநிலை: மேலுள்ள 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: பயிருக்கு 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**சுதாகரன் வாலிபன்**	தாவரவளர் வெப்பநிலை: 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**சாலமன் வாலிபன்**	மாறுபட்ட வெப்பநிலை: 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**விஸ்வரூப் மஜூம்தார்**	மாறுபட்ட வெப்பநிலை: 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C
Land preparation	Land Preparation: Undertake 3-4 ploughings and harrowings to achieve fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM (farmyard manure) when preparing the land.	**சுதீர் வீ சேவரி**	நிலம் தயாரித்தல்: நல்ல பதத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் பாய்படிக்கால் செய்யவும். நிலத்தைத் தயாரிக்கும்போது நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தைச் சேர்க்கவும்.	**ஸ்டாப் கண்ணன்**	நிலம் ஊராரிக்கும் நல்ல பதத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் பாய்படிக்கால் செய்யவும். நிலத்தைத் தயாரிக்கும்போது நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தைச் சேர்க்கவும்.	**ஸ்டாப் கண்ணன்**	நிலம் ஊராரிக்கும் நல்ல பதத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் பாய்படிக்கால் செய்யவும். நிலத்தைத் தயாரிக்கும்போது நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தைச் சேர்க்கவும்.	**விஸ்வரூப் மஜூம்தார்**	நிலம் ஊராரிக்கும் நல்ல பதத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் பாய்படிக்கால் செய்யவும். நிலத்தைத் தயாரிக்கும்போது நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தைச் சேர்க்கவும்.
Sowing Time	Sowing Time / Season: Sowing is recommended in February-March for early crops. In low-tained or protected cultivation, December sowing may be used for early yield.	**ஜுவர் வா மலை**	குளிர் கால வளர்ப்பிலான: ஜனவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் விதைகளை விதைப்பது சிறந்தது. வடக்கு சேர்ந்த மாநிலங்களில் ஜனவரி மாதம் விதைகளை விதைப்பது சிறந்தது.	**ஸ்டாலின் ஜோ**	ஜனவரி மாதம் / ஆடி மாதம் பயிர் வகை: ஜனவரி மாதம் விதைகளை விதைப்பது சிறந்தது.	**ஸ்டாலின் ஜோ**	ஜனவரி மாதம் / ஆடி மாதம் பயிர் வகை: ஜனவரி மாதம் விதைகளை விதைப்பது சிறந்தது.	**ஸ்டாலின் ஜோ**	ஜனவரி மாதம் / ஆடி மாதம் பயிர் வகை: ஜனவரி மாதம் விதைகளை விதைப்பது சிறந்தது.
Seed rate & Spacing	Spacing / Seed Rate / Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.5 m, seeds sown at 60 cm spacing between plants on beds. Seed rate: Approx. 1.9 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.	**சிவ கா ஸ்ரீ**	ஒரு ஏக்கருக்கு 1.9 கிலோ விதை தேவை. விதை ஆழம்: 2-3 செ.மீ.	**சிவசுந் வா அரி சிவா**	அரம் / சிவசுந் வா / ஏரியில் வைரம்: அரம் 2.5 மீட்டர் அகலம் கொண்ட மேடுகளில் விதைகளை 60 செ.மீ. இடைவெளியில் விதைக்கவும். விதை அளவு: ஏக்கருக்கு சுமார் 1.9 கிலோ. விதை ஆழம்: 2-3 செ.மீ.	**ஸ்டாலின் ஜோ**	அரம் / சிவசுந் வா / ஏரியில் வைரம்: அரம் 2.5 மீட்டர் அகலம் கொண்ட மேடுகளில் விதைகளை 60 செ.மீ. இடைவெளியில் விதைக்கவும். விதை அளவு: ஏக்கருக்கு சுமார் 1.9 கிலோ. விதை ஆழம்: 2-3 செ.மீ.	**ஸ்டாலின் ஜோ**	அரம் / சிவசுந் வா / ஏரியில் வைரம்: அரம் 2.5 மீட்டர் அகலம் கொண்ட மேடுகளில் விதைகளை 60 செ.மீ. இடைவெளியில் விதைக்கவும். விதை அளவு: ஏக்கருக்கு சுமார் 1.9 கிலோ. விதை ஆழம்: 2-3 செ.மீ.
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing (e.g., with suitable chemical such as Captan @ 2 g per kg seed) to protect against seed-borne diseases.	**சிவ ரசுவா**	விதை நேர்த்தி: விதை முளைப்பதற் முன் அதனை நல்ல மருந்தால் (உதாரணமாக, கேப்டன் @ 2 கிராம் ஒரு கிலோ விதைக்கு) நேர்த்தி செய்யவும்.	**சிவராம் மதிவாணன்**	விதை விதைக்கு முன்னர் விதைகளை ஏதேனும் ஒரு பூஞ்சாண கொல்லியால் (உதாரணமாக, கேப்டன் @ 2 கிராம் ஒரு கிலோ விதைகளுக்கு) நேர்த்தி செய்யவும்.	**சிவராம் மதிவாணன்**	விதை விதைக்கு முன்னர் விதைகளை ஏதேனும் ஒரு பூஞ்சாண கொல்லியால் (உதாரணமாக, கேப்டன் @ 2 கிராம் ஒரு கிலோ விதைகளுக்கு) நேர்த்தி செய்யவும்.	**சிவராம் மதிவாணன்**	விதை விதைக்கு முன்னர் விதைகளை ஏதேனும் ஒரு பூஞ்சாண கொல்லியால் (உதாரணமாக, கேப்டன் @ 2 கிராம் ஒரு கிலோ விதைகளுக்கு) நேர்த்தி செய்யவும்.
Weed Management	Fertilizer / Nutrient Management: Basal dose per acre: Urea 98 kg, SSP 125 kg, MOP 35 kg (equivalent to N 40 kg, P 20 kg, K 20 kg). Application: At land preparation apply basal; at sowing apply one third of nitrogen + full P & K; remaining N at vine growth stage.	**சுரேஷ் வா ஸ்ரீ**	ஒரு ஏக்கருக்கு: யூரியா 98 கிலோ, சூپர்ஃபாஸ்ஃபேட் 125 கிலோ, பொட்டாஷ் 35 கிலோ. (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாட்டு முறை: நிலத்தை தயாரிக்கும் போது அடி உரமிடவும்; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; கொடி நன்கு வளரும் நேரத்தில் மீதமுள்ள N.	**சுரேஷ் வா**	ஒரு ஏக்கருக்கு: யூரியா 98 கிலோ, சூپர்ஃபாஸ்ஃபேட் 125 கிலோ, பொட்டாஷ் 35 கிலோ. (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாட்டு முறை: நிலத்தை தயாரிக்கும் போது அடி உரமிடவும்; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; கொடி நன்கு வளரும் நேரத்தில் மீதமுள்ள N.	**சுரேஷ் வா**	ஒரு ஏக்கருக்கு: யூரியா 98 கிலோ, சூپர்ஃபாஸ்ஃபேட் 125 கிலோ, பொட்டாஷ் 35 கிலோ. (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாட்டு முறை: நிலத்தை தயாரிக்கும் போது அடி உரமிடவும்; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; கொடி நன்கு வளரும் நேரத்தில் மீதமுள்ள N.	**சுரேஷ் வா**	ஒரு ஏக்கருக்கு: யூரியா 98 கிலோ, சூپர்ஃபாஸ்ஃபேட் 125 கிலோ, பொட்டாஷ் 35 கிலோ. (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாட்டு முறை: நிலத்தை தயாரிக்கும் போது அடி உரமிடவும்; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; கொடி நன்கு வளரும் நேரத்தில் மீதமுள்ள N.
Fertilizer Management	Weed Control: Use manual hoeing and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.6 litre per 150 litre water for non-crop weeds.	**சுரேஷ் வா**	அலாவுகை சிகிச்சை: கை வீசித் தூண்டி அகிலா மருந்தியல் சிகிச்சை வழங்கவும். பயிர் அல்லாதவைக்கு: கிளைபோசேட் @ 1.6 லிட்டர் ஒரு 150 லிட்டர் தண்ணீருக்கு.	**வா வசுமாலா**	மண் சிகிச்சை: தரமான ஒருங்கிணைந்த களைக்கொல்லி சிகிச்சையாகவோ அல்லது கையால் வெட்டுதல். பயிர் அல்லாதவைக்கு: கிளைபோசேட் @ 1.6 லிட்டர் ஒரு 150 லிட்டர் தண்ணீருக்கு.	**வா வசுமாலா**	மண் சிகிச்சை: தரமான ஒருங்கிணைந்த களைக்கொல்லி சிகிச்சையாகவோ அல்லது கையால் வெட்டுதல். பயிர் அல்லாதவைக்கு: கிளைபோசேட் @ 1.6 லிட்டர் ஒரு 150 லிட்டர் தண்ணீருக்கு.	**வா வசுமாலா**	மண் சிகிச்சை: தரமான ஒருங்கிணைந்த களைக்கொல்லி சிகிச்சையாகவோ அல்லது கையால் வெட்டுதல். பயிர் அல்லாதவைக்கு: கிளைபோசேட் @ 1.6 லிட்டர் ஒரு 150 லிட்டர் தண்ணீருக்கு.
Irrigation Management	Irrigation: Frequent irrigation is required in summer, approx. 10-12 irrigations during the crop cycle. First irrigation pre-sowing, then every 2-3 days initially, later every 4-5 days. Drip irrigation is advantageous. Apni Kheti	**சிவராஜ் நல்லா**	சிவராஜ்: கால்நடை வா கால் சிவராஜ் ஆரம்பகாலம் ஏற்றி நீர் பாசனம் வகை 10-12 கால் சிவராஜ் ஏறாமி சிவராஜ் ஏறாமி நீர் ஆரம்பிக்க 2-3 நாட்கள் பின்னர் 4-5 நாட்கள் ஏறாமி. சொட்டு நீர் பாசனம் நன்மை தரக்கூடியது. அப்னி கேதி	**சிவா வரதராஜன்**	நீர்ப்பாசனம்: தேவைக்கு காலம் சிவராஜ் ஆரம்பகாலம் அவசர. பின்னர் தகவல் அரம்பி 1-1.5 நாள் சிவராஜ் வகை காலம். பயிர் சிவா ஏறாமி. ரவாமல் ஒருவாரம் ஏறா 2-3 நாளைக் அளவு ஏறாமி. சொட்டு நீர்ப்பாசனம் சிவராஜ் ஏறாமி. அப்னி கேதி	**நீர்ப்பாசன மேலாண்மை**	நீர்ப்பாசனம்: தேவைக்கு காலத்திலும் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது: பயிர் சுழற்சி காலத்திலும் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பும். பின்னர் ஆரம்பத்திலும் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும். பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேதி	**நீர்ப்பாசன மேலாண்மை**	நீர்ப்பாசனம்: தேவைக்கு காலத்திலும் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது: பயிர் சுழற்சி காலத்திலும் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பும். பின்னர் ஆரம்பத்திலும் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும். பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேதி	**நீர்ப்பாசன மேலாண்மை**	நீர்ப்பாசனம்: தேவைக்கு காலத்திலும் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது: பயிர் சுழற்சி காலத்திலும் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பும். பின்னர் ஆரம்பத்திலும் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும். பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேதி
Pest Management	Pest Management: Fruit flies, aphids common pests. Neem oil (@3% commonly recommended; practice crop hygiene.	**சீனு மகேஷ்**	சீனு மகேஷ்: பழ ஈக்கள், அஃபிட்ஸ் பொதுவான பூச்சிகள். வேப்பெண்ணெய் (3% அளவுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது); பயிரை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.	**பூபதி வைரவன்**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்ஸ் பொதுவான பூச்சிகள். வேப்பெண்ணெய் (3% அளவுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது); பயிரை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.	**பூபதி வைரவன்**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்ஸ் பொதுவான பூச்சிகள். வேப்பெண்ணெய் (3% அளவுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது); பயிரை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.	**Ace Jadrani**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்ஸ் பொதுவான பூச்சிகள். வேப்பெண்ணெய் (3% அளவுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது); பயிரை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.
Disease Management	Disease Management: Powdery mildew managed with fungicidal sprays (carbendazim etc.); mosaic and other foliar diseases controlled via appropriate sprays and sanitation.	**ரோ ஸ்வாமி**	ரோ ஸ்வாமி: சாம்பல் நோய் பூஞ்சான கொல்லி (கார்பென்டாசிம் வகை); மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் சரியான தெளிப்பான்கள் மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.	**ரோ ஸ்வாமி**	ரோ ஸ்வாமி: சாம்பல் நோய் பூஞ்சான கொல்லி (கார்பென்டாசிம் வகை); மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் சரியான தெளிப்பான்கள் மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.	**ரோ ஸ்வாமி**	ரோ ஸ்வாமி: சாம்பல் நோய் பூஞ்சான கொல்லி (கார்பென்டாசிம் வகை); மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் சரியான தெளிப்பான்கள் மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.	**ரோ ஸ்வாமி**	ரோ ஸ்வாமி: சாம்பல் நோய் பூஞ்சான கொல்லி (கார்பென்டாசிம் வகை); மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் சரியான தெளிப்பான்கள் மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Apni Kheti Typically 10-12 pickings are done. Yield: ~33-42 qtl/acre.	**வசந்த் ஸ்ரீ ரோ**	வசந்த்ஸ்ரீ: ஜுவர் கால் 45-50 நாள் கழ வகை ஏ ரோ ஜுவர் ஜுவர் நீர் ஜாமி நீர் அப்னி கேதி. அப்னி கேதி 10-12 வகை. ஜுவர் ஜுவர் ~33-42 ஜுவர் ஜுவர்.	**வசந்த் ஸ்ரீ ரோ**	வசந்த்ஸ்ரீ: ஜுவர் கால் 45-50 நாள் கழ வகை ஏ ரோ ஜுவர் ஜுவர் நீர் ஜாமி நீர் அப்னி கேதி. அப்னி கேதி 10-12 வகை. ஜுவர் ~33-42 ஜுவர் ஜுவர்.	**வசந்த் ஸ்ரீ ரோ**	வசந்த்ஸ்ரீ: ஜுவர் கால் 45-50 நாள் கழ வகை ஏ ரோ ஜுவர் ஜுவர் நீர் ஜாமி நீர் அப்னி கேதி. அப்னி கேதி 10-12 வகை. ஜுவர் ~33-42 ஜுவர் ஜுவர்.	**வசந்த் ஸ்ரீ ரோ**	வசந்த்ஸ்ரீ: ஜுவர் கால் 45-50 நாள் கழ வகை ஏ ரோ ஜுவர் ஜுவர் நீர் ஜாமி நீர் அப்னி கேதி. அப்னி கேதி 10-12 வகை. ஜுவர் ~33-42 ஜுவர் ஜுவர்.
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest & Handling: Harvest fruits when young & green, using sharp tool to avoid damage. Handle carefully, sort/grading for market. (Note: detailed post-harvest handling may need to be adapted locally.)	**சுதீர் வீ சேவரி வா வா ஸ்ரீ ரோ ஸ்ரீ வீரா**	சுதீர் வீ சேவரி: பழங்கள் சிறியவை மற்றும் பச்சை நிறமாக இருக்கும் போது அறுவடை செய்யவும். கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, சேதத்தைத் தவிர்க்க கவனமாகக் கையாளவும். சந்தைக்கு வரிசைப்படுத்தி/தரம் பிரித்து வைக்கவும். (குறிப்பு: பின்னர் அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உள்ளூர் அளவில் மாற்றியமைக்க வேண்டியிருக்கலாம்.)	**சுதீர் வீ சேவரி**	பழங்கள் சிறியவை மற்றும் பச்சை நிறமாக இருக்கும் போது அறுவடை செய்யவும். கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, சேதத்தைத் தவிர்க்க கவனமாகக் கையாளவும். சந்தைக்கு வரிசைப்படுத்தி/தரம் பிரித்து வைக்கவும். (குறிப்பு: பின்னர் அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உள்ளூர் அளவில் மாற்றியமைக்க வேண்டியிருக்கலாம்.)	**சுதீர் வீ சேவரி**	பழங்கள் சிறியவை மற்றும் பச்சை நிறமாக இருக்கும் போது அறுவடை செய்யவும். கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, சேதத்தைத் தவிர்க்க கவனமாகக் கையாளவும். சந்தைக்கு வரிசைப்படுத்தி/தரம் பிரித்து வைக்கவும். (குறிப்பு: பின்னர் அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உள்ளூர் அளவில் மாற்றியமைக்க வேண்டியிருக்கலாம்.)	**சுதீர் வீ சேவரி**	பழங்கள் சிறியவை மற்றும் பச்சை நிறமாக இருக்கும் போது அறுவடை செய்யவும். கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, சேதத்தைத் தவிர்க்க கவனமாகக் கையாளவும். சந்தைக்கு வரிசைப்படுத்தி/தரம் பிரித்து வைக்கவும். (குறிப்பு: பின்னர் அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உள்ளூர் அளவில் மாற்றியமைக்க வேண்டியிருக்கலாம்.)
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	**அமல்ராஜ்**	வி விவசாயி சமாவு, அரசாங்கம் மற்றும் சோதனை மையங்கள் அடிப்படையில். உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இரகம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**அமல்ராஜ்**	வி விவசாயி சமாவு, அரசாங்கம் மற்றும் சோதனை மையங்கள் அடிப்படையில். உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இரகம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**மதுமிகா**	இந்தப் பரிந்துரைகளுக்கு சிறப்புப் பயன்பாட்டு துவழுகள் (SAUகள்), அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் சோதனை வைப்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இரகம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**Revolex**	ஈ உபயோகப்படுவை SAUகள், முகமை வழுவை மற்றும் முயோசாக்டிக் கேழுவை ஆராய்ச்சி மையங்களை அடிப்படையில். மெய்ய முடிவுகள், காலநிலை, வி.பி.ஆர் மற்று பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளை பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**விஷ்ணு!**	ஈ உபயோகப்படுவை SAUகள், முகமை வழுவை மற்றும் முயோசாக்டிக் கேழுவை ஆராய்ச்சி மையங்களை அடிப்படையில். மெய்ய முடிவுகள், காலநிலை, வி.பி.ஆர் மற்று பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளை பொறுத்து மாறுபடலாம்.